

レジメン番号 m001 レジメン名 CMF

1クール 4週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
フルオロウラシル	600mg/m ²	day1,8
メトトレキサート	30mg/m ²	day1,8
シクロホスファミド	100mg/body	day1~14

	血管への影響	副作用/主な特徴
シクロホスファミド	—	骨髄抑制、悪心・嘔吐、脱毛、下痢
フルオロウラシル	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、口内炎、手足症候群 急速静注: RNA合成阻害(骨髄抑制に関与)、持続静注: DNA合成阻害
メトトレキサート	非炎症性抗がん剤	骨髄抑制、劇症肝炎、急性腎不全、間質性肺炎 血中濃度測定を行いロイコボリンで救援療法を行う

レジメン番号 m002 レジメン名 WeeklyパクリタキセルMMK

1クール 4週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

パクリタキセル

用量

90mg/m²

投与日

day1,8,15

	血管への影響	副作用/主な特徴
パクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用



京都中部総合医療センター
Kyoto Chubu Medical Center

レジメン番号 m003 レジメン名 CE

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
エピルビン	75mg/m ²	day1

シクロホスファミド	600mg/m ²	day1
-----------	----------------------	------

	血管への影響	副作用/主な特徴
エピルビン	壊死性抗がん剤	心毒性、着色尿、脱毛 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷

レジメン番号 m004 レジメン名 CEF

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
シクロホスファミド	500mg/m ²	day1
エピルビン	60mg/m ²	day1
フルオロウラシル	500mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
エピルビン	壊死性抗がん剤	心毒性、着色尿、脱毛 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
フルオロウラシル	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、口内炎、手足症候群 急速静注: RNA合成阻害(骨髄抑制に関与)、持続静注: DNA合成阻害

レジメン番号 m005 レジメン名 トラスツズマブ(3週毎・2クール目)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m006 レジメン名 トラスツズマブ(3週毎・初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	8mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m007 レジメン名 トラスツズマブ(2回以降)

1クール 1週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	2mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m008 レジメン名 トラスツズマブ(初回)

1クール 1週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	4mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m009 レジメン名 トラスツズマブ＋VNR(3週、2クール以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

トラスツズマブ

2mg/kg

day1,8,15

ビノレルビン

25mg/m²

day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
ビノレルビン	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、食欲不振、便秘、脱毛



京都中部総合医療センター
Kyoto Chubu Medical Center

レジメン番号 m010 レジメン名 トラスツズマブ+TXT(2週、2クール以降)

1クール 2週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	2mg/kg	day1,8

ドセタキセル	40mg/m ²	day1
--------	---------------------	------

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m011 レジメン名 トラスツズマブ+TXT(3週、2クール以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

トラスツズマブ

2mg/kg

day1,8,15

ドセタキセル

60mg/m²

day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング



京都中部総合医療センター
Kyoto Chubu Medical Center

レジメン番号 m012 レジメン名 トラスツズマブ+TXT(2週、初回)

1クール 15日

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	4mg/kg	day1
トラスツズマブ	2mg/kg	day9
ドセタキセル	40mg/m ²	day2

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m013 レジメン名 トラスツズマブ+TXT(3週、初回)

1クール 22日

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	4mg/kg	day1
トラスツズマブ	2mg/kg	day9,16
ドセタキセル	60mg/m ²	day2

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m014 レジメン名 トラスツズマブ+TXL(2クール以降)

1クール 4週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

トラスツズマブ

2mg/kg

day1,8,15,22

パクリタキセル

60mg/m²

day1,8,15

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
パクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用

レジメン番号 m015 レジメン名 トラスツズマブ+TXL(初回)

1クール 29日

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

トラスツズマブ

4mg/kg

day1

トラスツズマブ

2mg/kg

day9,16,23

パクリタキセル

60mg/m²

day2,9,16

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
パクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用

レジメン番号 m016 レジメン名 ドセタキセル(3週毎)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

ドセタキセル

用量

60mg/m²

投与日

day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝



レジメン番号 m017 レジメン名 VNR(2投1休)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
ビノレルビン	25mg/m ²	day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
ビノレルビン	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、食欲不振、便秘、脱毛

レジメン番号 m018 レジメン名 GEM(乳腺)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

ゲムシタビン

用量

1250mg/m²

投与日

day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
ゲムシタビン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制(血小板)、血管痛、間質性肺炎 血管痛出現時は患部を温める



京都中部総合医療センター
Kyoto Chubu Medical Center

レジメン番号 m019 レジメン名 トラスツズマブ＋GEM(初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	4mg/kg	day1
トラスツズマブ	2mg/kg	day8,15
ゲムシタビン	1250mg/m ²	day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
ゲムシタビン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制(血小板)、血管痛、間質性肺炎 血管痛出現時は患部を温める
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m020 レジメン名 トラスツズマブ＋GEM(2クール以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

トラスツズマブ

2mg/kg

day1,8,15

ゲムシタビン

1250mg/m²

day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
ゲムシタビン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制(血小板)、血管痛、間質性肺炎 血管痛出現時は患部を温める
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m021 レジメン名 トラスツズマブ＋VNR(3週、初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	4mg/kg	day1
トラスツズマブ	2mg/kg	day8,15
ビノレルビン	25mg/m ²	day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
ビノレルビン	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、食欲不振、便秘、脱毛

レジメン番号 m022 レジメン名 CPT-11(乳腺)

1クール 4週

催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

イリノテカン

100mg/m²

day1,8,15

	血管への影響	副作用/主な特徴
イリノテカン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、下痢 UGT1A1検査、止瀉薬(ロペラミド)を適宜使用



レジメン番号 m023 レジメン名 ハラヴェン単剤療法

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名
エリ布林

用量
1.4mg/m²

投与日
day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
エリ布林	非炎症性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、肝機能障害

レジメン番号 m024 レジメン名 wPTX+BEV

1クール 4週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

パクリタキセル

90mg/m²

day1,8,15

ベバシズマブ

10mg/kg

day1,15

	血管への影響	副作用/主な特徴
ベバシズマブ	非炎症性抗がん剤	高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔 家庭血圧測定、大手術前後4週間は休薬
パクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用

レジメン番号 m025 レジメン名 Ptz+T+D(初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
ペルツズマブ	840mg/body	day1
トラスツズマブ	8mg/kg	day1
ドセタキセル	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
ペルツズマブ	非炎症性抗がん剤	好中球減少症、Infusion reaction、肝機能障害

レジメン番号 m026 レジメン名 Ptz+T+D(2回目以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
ペルツズマブ	420mg/body	day1
トラスツズマブ	6mg/kg	day1
ドセタキセル	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
ペルツズマブ	非炎症性抗がん剤	好中球減少症、Infusion reaction、肝機能障害

レジメン番号 m027 レジメン名 カドサイラ

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

トラスツス・マブ・エンタンシン

3.6mg/kg

day1

血管への影響

副作用/主な特徴

トラスツス・マブ・エンタンシン

炎症性抗がん剤

倦怠感、鼻出血、悪心、発熱、食欲不振、Infusion reaction

レジメン番号 m028 レジメン名 ハラヴェン+Tmab(初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
エリブリン	1.4mg/m ²	day1,8
トラスツズマブ	8mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
エリブリン	非炎症性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、肝機能障害

レジメン番号 m029 レジメン名 ハラヴェン+Tmab(2クール目以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
エリブリン	1.4mg/m ²	day1,8
トラスツズマブ	6mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
エリブリン	非炎症性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、肝機能障害

レジメン番号 m030 レジメン名 ABI単剤(乳腺)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

nabパクリタキセル

用量

260mg/m²

投与日

day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
nabパクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝



京都中部総合医療センター
Kyoto Chubu Medical Center

レジメン番号 m031 レジメン名 nab-PTX+トラスツズマブ(初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	8mg/kg	day1
nabパクリタキセル	260mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
nabパクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m032 レジメン名 nab-PTX+トラスツズマブ(2回目以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg	day1
nabパクリタキセル	260mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
nabパクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m033 レジメン名 TC+トラスツズマブ(初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	8mg/kg	day1
シクロホスファミド	600mg/m ²	day1
ドセタキセル	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m034 レジメン名 TC+トラスツズマブ(2回目以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg	day1
シクロホスファミド	600mg/m ²	day1
ドセタキセル	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m035 レジメン名 FEC100

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
シクロホスファミド	500mg/m ²	day1
エピルビン	100mg/m ²	day1
フルオロウラシル	500mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
エピルビン	壊死性抗がん剤	心毒性、着色尿、脱毛 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
フルオロウラシル	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、口内炎、手足症候群 急速静注: RNA合成阻害(骨髄抑制に関与)、持続静注: DNA合成阻害

レジメン番号 m036 レジメン名 TC療法

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
シクロホスファミド	600mg/m ²	day1
ドセタキセル	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
ドセタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝

レジメン番号 m037 レジメン名 Ptz+T(初回)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
ペルツズマブ	840mg/body	day1

トラスツズマブ	8mg/kg	day1
---------	--------	------

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
ペルツズマブ	非炎症性抗がん剤	好中球減少症、Infusion reaction、肝機能障害

レジメン番号 m038 レジメン名 Ptz+T(2回目以降)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
ペルツズマブ	420mg/body	day1
トラスツズマブ	6mg/kg	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
トラスツズマブ	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
ペルツズマブ	非炎症性抗がん剤	好中球減少症、Infusion reaction、肝機能障害

レジメン番号 m039 レジメン名 アテゾリズマブ＋nab-PTX

1クール 4週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
アテゾリズマブ	840mg/body	day1,15

nabパクリタキセル	100mg/m ²	day1,8,15
------------	----------------------	-----------

	血管への影響	副作用/主な特徴
nabパクリタキセル	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝
アテゾリズマブ	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)

レジメン番号 m040 レジメン名 Ptz+T+nab-PTX(初回)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
パージェタ注	420mg/body	day1
トラスツズマブ注	8mg/kg	day1
アブラキサン注	260mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
アブラキサン注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝
トラスツズマブ注	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
パージェタ注	非炎症性抗がん剤	好中球減少症、Infusion reaction、肝機能障害

レジメン番号 m041 レジメン名 Ptz+T+nab-PTX(2回目以降)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
パージェタ注	420mg/body	day1
トラスツズマブ注	6mg/kg	day1
アブラキサン注	260mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
アブラキサン注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝
トラスツズマブ注	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング
パージェタ注	非炎症性抗がん剤	好中球減少症、Infusion reaction、肝機能障害

レジメン番号 m042 レジメン名 Tmab+DTX(初回)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ注	8mg/kg	day1
ドセタキセル注	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ注	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m043 レジメン名 Tmab+DTX(2回目以降)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
トラスツズマブ注	6mg/kg	day1
ドセタキセル注	75mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
ドセタキセル注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、浮腫、脱毛 アルコール過敏注意、CYP3A4で代謝
トラスツズマブ注	非炎症性抗がん剤	心障害、Infusion reaction 心障害は可逆的、定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m044 レジメン名 TDXd(乳腺)

1クール 3週

催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名

用量

投与日

エンハーツ注

5.4mg/kg

day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
エンハーツ注	炎症性抗がん剤	間質性肺炎、骨髄抑制、心障害 定期的な心エコーで左室駆出率をモニタリング

レジメン番号 m045 レジメン名 Pembrolizumab+PTX

1クール 12週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	day1,22,43,64

パクリタキセル注	90mg/m ²	day1,8,15,29,36,43,57,64,71
----------	---------------------	-----------------------------

	血管への影響	副作用/主な特徴
キイトルーダ注	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)
パクリタキセル注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用

レジメン番号 m046 レジメン名 Pembrolizumab+nab-PTX

1クール 12週 催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	day1,22,43,64
アブラキサン注	100mg/m ²	day1,8,15,29,36,43,57,64,71

	血管への影響	副作用/主な特徴
アブラキサン注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝
キイトルーダ注	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)

レジメン番号 m047 レジメン名 Pembrolizumab+GEM+CBDCA

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	day1
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	day1,8
カルボプラチン注	AUC2	day1,8

	血管への影響	副作用/主な特徴
カルボプラチン注	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、腎機能障害 Calvertの式より投与量算出
キイトルーダ注	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)
ゲムシタビン注	炎症性抗がん剤	骨髄抑制(血小板)、血管痛、間質性肺炎 血管痛出現時は患部を温める

レジメン番号 m048 レジメン名 Pembrolizumab+PTX+CBDCA

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	day1
パクリタキセル注	80mg/m ²	day1,8,15
カルボプラチン注	AUC5	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
カルボプラチン注	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、腎機能障害 Calvertの式より投与量算出
キイトルーダ注	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)
パクリタキセル注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用

レジメン番号 m049 レジメン名 Pembrolizumab+EC

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	day1
エピルビシン注	90mg/m ²	day1
エンドキサン注	600mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
エピルビシン注	壊死性抗がん剤	心毒性、着色尿、脱毛 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
エンドキサン注	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
キイトルーダ注	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)

レジメン番号 m050 レジメン名 Pembrolizumab (乳腺)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
キイトルーダ注	非炎症性抗がん剤	irAe(下痢・大腸炎、内分泌障害、間質性肺炎、1型糖尿病など)

レジメン番号 m051 レジメン名 dose-dense EC

1クール 2週 催吐リスク(レジメン) 高度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
エピルビシン注	90mg/m ²	day1
エンドキサン注	600mg/m ²	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
エピルビシン注	壊死性抗がん剤	心毒性、着色尿、脱毛 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
エンドキサン注	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷

レジメン番号 m052 レジメン名 dose-dense PTX(術後)

1クール 12週

催吐リスク(レジメン) 軽度催吐リスク

薬品名

パクリタキセル注

用量

80mg/m²

投与日

day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

	血管への影響	副作用/主な特徴
パクリタキセル注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 アルコール過敏注意、CYP2C8・CYP3A4で代謝、DEHPフリールート使用

レジメン番号 m053 レジメン名 フェスゴIN(初回)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
フェスゴ注IN	15mL	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
フェスゴ注IN	非炎症性抗がん剤	Infusion reaction、骨髄抑制、下痢、心障害

レジメン番号 m054 レジメン名 フェスゴMA(維持)

1クール 3週 催吐リスク(レジメン) 最小度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
フェスゴ注MA	10mL	day1

	血管への影響	副作用/主な特徴
フェスゴ注MA	非炎症性抗がん剤	Infusion reaction、骨髄抑制、下痢、心障害

レジメン番号 m055 レジメン名 dose-dense nab-PTX

1クール 12週

催吐リスク(レジメン)

薬品名

アブラキサン注

用量

100mg/m²

投与日

day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64,71,78

	血管への影響	副作用/主な特徴
アブラキサン注	壊死性抗がん剤	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛 特定生物由来製品、CYP2C8・CYP3A4で代謝