

レジメン番号 **b040** レジメン名 R-CHOP(day1)

1クール **3週**

催吐リスク(レジメン) **中等度催吐リスク**

薬品名	用量	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	day1

シクロホスファミド	750mg/m ²	day1
-----------	----------------------	------

ドキシソルビン	50mg/m ²	day1
---------	---------------------	------

プレドニゾロン	100mg/body	day1~5
---------	------------	--------

ビンクリスチン	1.4mg/m ²	day1,上限2mg
---------	----------------------	------------

	血管への影響	副作用/主な特徴
シクロホスファミド	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、出血性膀胱炎、悪心・嘔吐 出血性膀胱炎予防として水分負荷
ビンクリスチン	壊死性抗がん剤	末梢神経障害、錯乱・昏睡、消化管穿孔、難聴、脱毛、間質性肺炎 最大投与量2mg/body/day
ドキシソルビン	壊死性抗がん剤	心筋障害、骨髄抑制、脱毛、着色尿 アントラサイクリン系薬剤として生涯投与量制限あり
プレドニゾロン	—	
リツキシマブ	非炎症性抗がん剤	アナフィラキシー、肺障害、劇症肝炎、間質性肺炎 前投薬: 抗ヒスタミン・副腎皮質ホルモン・解熱鎮痛剤