

レジメン番号 **g044** レジメン名 **FOLFIRI-2+C-mab(初回)**

1クール **2週** 催吐リスク(レジメン) **中等度催吐リスク**

薬品名	用量	投与日
セツキシマブ	400mg/m ²	day1
レボホリナート	200mg/m ²	day1
イリノテカン	150mg/m ²	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	day1,ホーラス
フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1,46時間
セツキシマブ	250mg/m ²	day8

	血管への影響	副作用/主な特徴
セツキシマブ	非炎症性抗がん剤	皮膚障害、爪囲炎、低マグネシウム血症、Infusion reaction 前投薬: 抗ヒスタミン・副腎皮質ホルモン
イリノテカン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、下痢 UGT1A1検査、止瀉薬(ロペラミド)を適宜使用
フルオロウラシル	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、口内炎、手足症候群 急速静注: RNA合成阻害(骨髄抑制に関与)、持続静注: DNA合成阻害
レボホリナート	—	フルオロウラシルによる副作用が強くなる フルオロウラシルのDNA合成阻害作用を増強し抗腫瘍効果を高める

