

レジメン番号 **g047** レジメン名 **FOLFOX6+C-mab(2クール目以降)**

1クール **2週** 催吐リスク(レジメン) **中等度催吐リスク**

薬品名	用量	投与日
セツキシマブ	250mg/m ²	day1,8
オキサリプラチン	85mg/m ²	day1
レボホリナート	200mg/m ²	day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	day1,ホーラス
フルオロウラシル	2400mg/m ²	day1,46時間

	血管への影響	副作用/主な特徴
セツキシマブ	非炎症性抗がん剤	皮膚障害、爪囲炎、低マグネシウム血症、Infusion reaction 前投薬: 抗ヒスタミン・副腎皮質ホルモン
オキサリプラチン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、過敏症、末梢神経障害 総投与量680mg/m ² でGrade2の末梢神経障害が20%以上出現、低温との接触を避ける
フルオロウラシル	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、口内炎、手足症候群 急速静注: RNA合成阻害(骨髄抑制に関与)、持続静注: DNA合成阻害
レボホリナート	—	フルオロウラシルによる副作用が強くなる フルオロウラシルのDNA合成阻害作用を増強し抗腫瘍効果を高める