

レジメン番号 **g049** レジメン名 **FOLFIRINOX(末梢)**

1クール 2週 催吐リスク(レジメン) 中等度催吐リスク

薬品名	用量	投与日
オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	day1
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	day1
イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	day1
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	day1,ホーラス
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	day1,46時間

	血管への影響	副作用/主な特徴
イリノテカン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、下痢 UGT1A1検査、止瀉薬(ロペラミド)を適宜使用
オキサリプラチン	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、過敏症、末梢神経障害 総投与量680mg/m <sup>2</sup> でGrade2の末梢神経障害が20%以上出現、低温との接触を避ける
フルオロウラシル	炎症性抗がん剤	骨髄抑制、口内炎、手足症候群 急速静注:RNA合成阻害(骨髄抑制に関与)、持続静注:DNA合成阻害
レボホリナート	—	フルオロウラシルによる副作用が強くなる フルオロウラシルのDNA合成阻害作用を増強し抗腫瘍効果を高める